



Membranski potencial



Membrana določa mejo celice


- Celica očitno zelo natančno uravnava koncentracije posameznih ionov
- Celica je polna (predvsem negativno) nabitih proteinov, ki ne morejo prosto prehajati membrane.

Component	Intracellular concentration [mM]	Extracellular concentration [mM]
Na ⁺	5–15	145
K ⁺	140	5
Mg ²⁺	0.5	1–2
Ca ²⁺	10^{-4}	1–2
H ⁺	$7 \cdot 10^{-4}$ (pH 7.2)	$4 \cdot 10^{-5}$ (pH 7.4)
Cl ⁻	5–15	110



Membrana določa prepustnost snovi

- Tudi majhni ioni ne morejo skozi hidrofobni del lipidne membrane.
- Specifični ionski kanal močno poveča prepustnost določene vrste ionov




Negativni potencial potegne katione na notranjo stran membrane, dokler difuzija ne uravnovesi električnega privlaka (pasivni transport!).

Razlika v koncentracijah – membranski potencial

V ravovesju preko membrane ni toka, kemijski potencial ionov je na obeh straneh enak!

$$kT \ln(c_{in}) + eV_{in} = kT \ln(c_{out}) + eV_{out}$$



Nernstov membranski potencial ($\Delta V = V_{in} - V_{out}$):

$$\Delta V = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{c_{out}}{c_{in}} \right)$$

c ... koncentracija ionov znotraj/zunaj celice
 e ... naboj ionov (ze_0)
 V ... električni potencial znotraj/zunaj celice

Kakšno razmerje koncentracij ustvari 100 mV potenciala?


A celična membrana ni v ravnovesju

Nernst-Planckova enačba:

Tok ionov = osmotski tok + električni tok

$$j = -D \nabla c - w e c \nabla V$$

gradient koncentracije koncentracija x gradient električnega potenciala



Ker se tako potencial kot koncentracija z globino spreminja, konstanten tok raje izrazimo s potencialno razliko in robnima koncentracijama:

$$j = -w \frac{e \Delta V}{d} \frac{\left(c_{in} e^{\frac{e \Delta V}{kT}} - c_{out} \right)}{\left(e^{\frac{e \Delta V}{kT}} - 1 \right)}$$

$$\nabla c = \frac{dc}{dx}$$
 ... gradient (odvod, naklon) koncentracije

- D ... difuzijski koeficient
 $w=D/kT$... gibljivost
 d ... debelina membrane

Ko so okrog membrane različni ioni

- V **nespremenljivem stanju**, ko se vsi tokovi uravnovesijo in je skupni tok $\sum j_i = 0$, se vzpostavi **difuzijski potencial** (Goldman-Hodgkin-Katz):


$$\Delta V = \frac{kT}{e} \ln \left(\frac{\sum_{i+} P_i c_{i,out}^+ + \sum_{i-} P_i c_{i,in}^-}{\sum_{i+} P_i c_{i,in}^+ + \sum_{i-} P_i c_{i,out}^-} \right)$$

$P = D/d$... prepustnost

- **Donnanovo ravnovesje:**


Preko selektivno prepustne membrane se ustvarijo gradienti koncentracij različnih ionov

- Naboji membranskih molekul (fosfatidilserin, etanolamin, glikozilirani lipidi, proteini, ...) dodatno spremenijo potencial na površini membrane



Gradiente koncentracij ionov vzdržujejo črpalke


- Z vloženo energijo (ATP) ionske črpalke z aktivnim transportom vzdržujejo gradienete koncentracij, ki poganjajo pasivne tokove skozi kanale.



- Gradiente koncentracij prečrpanih ionov lahko celice izkoristijo za prenos drugih snovi (kotransporterji) in signalov (akcijski potencial, vdor kalcija idr).

Ionsko ravovesje na membrani senzorske celice


Tekmujejo **pasivna difuzija, aktivni transport ionov ter regulacija!**





Prepustnost kanalov je odvisna od

- potenciala, ki je odvisen od koncentracij ionov na obeh straneh membrane, in
- koncentracije signalnih prenašalcev kot je cGMP, ki jo lahko spreminjajo encimi, vezani na različne senzorje



Membranski potencial je osnova za detekcijo



- Membrana senzorja v temi




- Membrana senzorja ob osvetlitvi





Absorpcija fotona → konformacijska sprememba antene (retinala) → konformacijska sprememba fotoproteina (opsina) in signalnega proteina (transducina) → aktivacija encima (fosfodiesteraze) → znižanje cGMP → zapiranje Na⁺ kanalčkov → hiperpolarizacija membranskega potenciala → zapiranje Ca⁺⁺ kanačkov → blokiranje izločanja signalnih prenašalcev → aktivacija bipolarnih celic

Membranski potencial prenaša signal po nevronih



Začne se s sproščanjem signalnih prenašalcev preko sinapse.

Sledi odpiranje Na^+ in K^+ kanalčkov, membranski potencial zaniha.



Večja intenziteta dražljaja se signalizira z bolj pogostimi pulzi
→ občutljivost na več velikostnih razredov intenzitete